

## TETANET BURNET® VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL TÉTANOS

### ¿Qué es TETANET BURNET®?

TETANET BURNET® es una vacuna antitetánica destinada a proteger a los animales de la enfermedad del tétanos. Es una enfermedad producida por las toxinas generadas por el Clostridium tetani. Es una enfermedad infecciosa grave, altamente mortal, que afecta a todas las especies de animales domésticos. Se caracteriza clínicamente por presentar hiperestesia, tetania, convulsiones y muerte.

### ¿Cómo funciona TETANET BURNET®?

TETANET BURNET® es una suspensión inactivada de toxoides de Clostridium tetani, la cual presenta como adyuvante gel de aluminio. La misma luego de ser inoculada en los animales produce una respuesta inmunológica generando anticuerpos contra las toxinas responsables del sufrimiento y muerte en los animales.

### ¿Por qué se necesita TETANET BURNET®?

Para prevenir la enfermedad en las distintas especies. El Clostridium tetani en su forma esporulada se perpetua en el medio ambiente y también en el intestino de los animales. Ingresa a los animales a través heridas punzantes y profundas, durante la parición, el cambio de dientes. Cuando encuentran condiciones de anaerobiosis apropiadas producen neurotoxinas desarrollando la enfermedad clínica. Esta patología presenta un porcentaje de mortalidad muy elevado en las distintas especies porque una vez que se instauran los signos clínicos es difícil revertir la situación, por ello la vacunación es la herramienta con la que contamos para su prevención.

**Dosis y administración:** Subcutánea SC.

**Equinos y bovinos:** 2 ml.

**Ovinos, porcinos y caninos gatos:** 1 ml.



### Esquema de inmunización:

#### Se recomienda el uso en yeguas, bovinos, ovinos porcinos:

Dos dosis 60-30 días antes del parto en primovacunadas. Revacunar anualmente 30 días pre parto.

En yeguas, bovinos, ovinos porcinos también utilizar previo a maniobras quirúrgicas (castración, descole, señalada) con doble dosis 60-30 días previo a la maniobra. En caso de que estén vacunados, utilizar una sola dosis 30 días previos.

#### Caninos y felinos previo a cirugías menores o mayores:

Dos dosis con intervalo de 20-30 días.

Revacunar anualmente.

La vacuna no presenta efectos colaterales adversos en hembras preñadas.

### **Advertencias**

No someter a los animales a arrosos o trabajos pesados antes y después de la vacunación. No administrar a animales parasitados, desnutridos, fatigados o con estados febriles o bajo tratamiento de antibióticos y corticoides.

### **Presentaciones:**

Estuche de 20 frascos de 4 mL.

Frasco de 20 mL, 50 mL y 100 mL.



**Dr. Fabián Cairó**  
Director Técnico

LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I. y A.



**Dr. Leonardo De Luca**  
Director Científico

LABORATORIOS BURNET S.A.C.I.F.I. y A.



**BURNET**